

Bayofly® Pour-on

(*Haematobia irritans*, *Haematobia stimulans*, *Musca autumnalis*, *Hydrotaea* spp., *Haematopota* spp.).

Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Kälbern. Bayofly® Pour-on sollte nur auf gesunde Hautpartien aufgetragen werden.

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart: Keine Angaben.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Der direkte Kontakt mit der Haut und der Schleimhaut sowie mit den Augen ist zu vermeiden. Bei der Anwendung des Arzneimittels sind Schutzhandschuhe zu tragen. Bei der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Bei versehentlichem Kontakt (Schleimhäute, Augen) gründlich mit Wasser ausspülen. Nach der Anwendung die Hände gründlich reinigen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen. Toxisch für Fische, Reptilien und Bienen. Darf nicht in Gewässer gelangen.

Nebenwirkungen: Wie bei anderen Pyrethroiden kann es nach der Anwendung von Bayofly® Pour-on gelegentlich zu vorübergehenden Unruheerscheinungen kommen.

Anwendung während Trächtigkeit und Laktation: Keine Angaben.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung mit Art und Dauer der Anwendung: 10 ml pro Tier.
(500 kg KGW: entsprechend 0,2 mg Cyfluthrin pro kg KGW)

Bayofly Pour-on ist eine gebrauchsfertige Lösung zum Aufgießen auf den Rücken. Mit der Dosierflasche wird Bayofly Pour-on entlang der Rückenlinie der Tiere aufgetragen.

Bayofly® Pour-on

Laktierende Kühe sollen nach dem Melken behandelt werden. Die Behandlung ist je nach Fliegendruck nach 4 - 6 Wochen zu wiederholen.

Überdosierung:

Überdosierungen mit Bayofly® Pour-on können - wie bei anderen Pyrethroiden - zu vorübergehenden Anzeichen von Erregung und Unruhe wie Schwanzschlagen und Lecken der Flanken führen. Eine akzidentelle orale Aufnahme und großflächige Hautläsionen können zu Vergiftungserscheinungen wie z.B. Salivation, klonische Krämpfe und Parästhesien führen. Die Therapie kann nur symptomatisch und unterstützend erfolgen. Es gibt kein spezifisches Antidot gegen Pyrethrum und Derivate.

Wartezeit:

Rind:

Essbare Gewebe: 0 Tage
Milch: 0 Tage

Unverträglichkeiten:

Keine bekannt.

Dauer der Haltbarkeit des Tierarzneimittels nach Anbruch des Behältnisses:

Keine Angaben.

Dauer der Haltbarkeit der gebrauchsfertigen Zubereitung:

Nicht zutreffend.

Besondere Lager- und Aufbewahrungshinweise:

Nicht unter + 8°C lagern.

Bayofly® Pour-on sollte von Nahrungsmitteln und Getränken sowie von Futtermitteln getrennt aufbewahrt werden.

Arzneimittel nach Ablauf des auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Bayofly® Pour-on



Art und Beschaffenheit des Behältnisses: Flasche mit 500 ml

Verschreibungsstatus: Apothekenpflichtig

Art der Anwendung: Zum Aufgießen auf den Rücken.

Warnhinweise: Der direkte Kontakt mit der Haut und der Schleimhaut sowie mit den Augen ist zu vermeiden. Bayofly® Pour-on ist für den äußerlichen Gebrauch zur Insektenvernichtung bestimmt und darf weder von Tieren noch von den Menschen innerlich aufgenommen werden.